ÍNDICE DE CONTENIDOS

| LO | s auto | res | | 15 |
|-----|--------------|----------|--|----|
| Ag | radeci | miento | S | 17 |
| Pro | Prólogo | | 19 | |
| Int | Introducción | | 21 | |
| Ab | reviat | uras | | 25 |
| | | | | |
| | | | CAPÍTULO 1 | |
| | | | ESTUDIO PRELIMINAR | |
| | Dorf | il ciont | tífico de un ilustrado autodidacta | 90 |
| I. | | | | 29 |
| 2. | La i | _ | ía en la época de Cabrera | 35 |
| | 2.I | | catalano-balear | 39 |
| | 2.2 | | Cantábrico | 41 |
| | 2.3 | | de Galicia | 43 |
| | 2.4 | Golfo | o de Cádiz y mar de Alborán | 44 |
| | 2.5 | Resu | men | 47 |
| 3. | Hist | oria de | e «La Ictiología de Andalucía» | 49 |
| | 3. I | Los | documentos | 49 |
| | 3.2 | Auto | ría | 51 |
| | 3.3 | «Forr | mar la Ictiología de Andalucía», un proyecto inacabado | 56 |
| 4. | Estu | dio de | e los documentos | 64 |
| | 4. I | Estru | uctura y contenido | 64 |
| | | 4.1.1 | Introducción | 64 |
| | | 4.1.2 | Cómo identificaba Cabrera las especies | 65 |
| | | 4.1.3 | Elementos analizados | 67 |
| | | | Entradas | 68 |
| | | | Ictiónimos | 68 |
| | | | Nombres científicos | 68 |
| | | | Descripciones científicas | 69 |
| | | 4.1.4 | | 69 |
| | | | Entradas e ictiónimos | 70 |
| | | | Especies | 71 |
| | | | La transcripción de Martín Ferrero (1997) | 73 |

| | | | Nombres científicos | 78 |
|----|------------|----------------|--|-----|
| | | | Descripciones científicas de géneros y especies | 78 |
| | | | Ictiónimos | 82 |
| | | | Especies | 82 |
| | | | Especies nuevas | 82 |
| | | 4.1.6 | La Addenda | 87 |
| | | | Entradas | 87 |
| | | | Nombres científicos y especies nuevas | 88 |
| | | | Ictiónimos | 88 |
| | | | Especies | 88 |
| | | 4. I.7 | La Lista impresa | 89 |
| | | | Entradas | 90 |
| | | | Nombres científicos y especies nuevas | 91 |
| | | | Ictiónimos | 92 |
| | | | Especies | 93 |
| | | 0 | Cómo utilizó Machado (1857) la Lista impresa | 94 |
| | | 4.1.8 | La Lista de Bloch | 97 |
| | | 4.1.9 | Las cartas de Cabrera a Clemente | 98 |
| | | 4.I. IO | La Colección del Instituto de Cádiz | 98 |
| | $4\cdot^2$ | Síntes | is general de la aportación ictiológica de Cabrera | 99 |
| | | | | |
| | | | CAPÍTULO 2 | |
| | | | CATÁLOGO CRÍTICO E ILUSTRADO | |
| | | | DE LAS ESPECIES ESTUDIADAS POR CABRERA | |
| ı. | Ord | enación | taxonómica de las especies | 109 |
| 2. | Fich | as desc | riptivas de las especies | 117 |
| | 2.I | Conte | enido de las fichas descriptivas de las especies | 117 |
| | | 2.I.I | Aportación de Cabrera | 117 |
| | | 2.I.2 | Estado actual | |
| | | | Nombre científico | 118 |
| | | | Posición taxonómica | 118 |
| | | | Ilustración | 811 |
| | | | Citas en obras anteriores a Cabrera | 119 |
| | | | Primera cita posterior a Cabrera | 119 |
| | | 2.1.3 | Análisis | 120 |
| | | | Etimológico | 120 |
| | | | Ictionímico | 120 |
| | | | Taxonómico | 120 |
| | | | | |
| | | | | |

4.1.5 La Memoria descriptiva

Entradas

Portadilla e introducción

8

73

73

75

| 2.2 | Especies que Cabrera describió y determinó | | |
|-----|--|---|-----|
| | Ι. | Lampetra fluviatilis (Linnaeus, 1758) | 122 |
| | 2. | Petromyzon marinus Linnaeus, 1758 | 124 |
| | 3. | Heptranchias perlo (Bonnaterre, 1788) | 126 |
| | 4. | Hexanchus griseus (Bonnaterre, 1788) | 128 |
| | 5. | Alopias vulpinus (Bonnaterre, 1788) | 130 |
| | 6. | Carcharodon carcharias (Linnaeus, 1758) | 132 |
| | 7. | Isurus oxyrinchus Rafinesque, 1810 | 134 |
| | 8. | Scyliorhinus canicula (Linnaeus, 1758) | 136 |
| | 9. | Scyliorhinus stellaris (Linnaeus, 1758) | 138 |
| | IO. | Galeorhinus galeus (Linnaeus, 1758) | 140 |
| | II. | Mustelus asterias Cloquet, 1819 | 142 |
| | 12. | Mustelus mustelus (Linnaeus, 1758) | 144 |
| | 13. | Prionace glauca (Linnaeus, 1758) | 146 |
| | 14. | Sphyrna tudes (Valenciennes, 1822) | 148 |
| | 15. | Sphyrna zygaena (Linnaeus, 1758) | 150 |
| | 16. | Dalatias licha (Bonnaterre, 1788) | 152 |
| | 17. | Etmopterus spinax (Linnaeus, 1758) | 154 |
| | 18. | Squalus acanthias Linnaeus, 1758 | 156 |
| | 19. | Squalus blainville (Risso, 1827) | 158 |
| | 20. | Echinorhinus brucus (Bonnaterre, 1788) | 160 |
| | 21. | Squatina squatina (Linnaeus, 1758) | 162 |
| | 22. | Torpedo torpedo (Linnaeus, 1758) | 164 |
| | 23. | Rhinobatos rhinobatos (Linnaeus, 1758) | 166 |
| | 24. | Glaucostegus cemiculus (Geoffroy Saint-Hilaire, 1817) | 168 |
| | 25. | Dipturus batis (Linnaeus, 1758) | 170 |
| | 26. | Dipturus oxyrinchus (Linnaeus, 1758) | 172 |
| | 27. | Raja clavata Linnaeus, 1758 | 174 |
| | 28. | Raja miraletus Linnaeus, 1758 | 176 |
| | 29. | Rostroraja alba (Lacépède, 1803) | 178 |
| | 30. | Dasyatis pastinaca (Linnaeus, 1758) | 180 |
| | 31. | Aetomylaeus bovinus (Geoffroy Saint-Hilaire, 1817) | 182 |
| | 32. | Myliobatis aquila (Linnaeus, 1758) | 184 |
| | 33. | Acipenser sturio Linnaeus, 1758 | 186 |
| | 34. | Muraena helena Linnaeus, 1758 | 188 |
| | 35. | Apterichtus caecus (Linnaeus, 1758) | 190 |
| | 36. | Echelus myrus (Linnaeus, 1758) | 192 |
| | 37. | Conger conger (Linnaeus, 1758) | 194 |
| | 38. | Anguilla anguilla (Linnaeus, 1758) | 196 |
| | 39. | Alosa alosa (Linnaeus, 1758) | 198 |
| | 40. | Alosa fallax (Lacépède, 1803) | 200 |
| | 41. | Sardina pilchardus (Walbaum, 1792) | 202 |
| | 42. | Engraulis encrasicolus (Linnaeus, 1758) | 204 |
| | 43. | Carassius auratus (Linnaeus, 1758) | 206 |
| | 44. | Luciobarbus sclateri (Günther, 1868) | 208 |

Índice de contenidos 9

| 45. | Argentina sphyraena Linnaeus, 1758 | 210 |
|-----|--|-------------|
| 46. | Zeus faber Linnaeus, 1758 | 212 |
| 47. | Phycis blennoides (Brünnich, 1768) | 214 |
| 48. | Phycis phycis (Linnaeus, 1766) | 216 |
| 49. | Trisopterus luscus (Linnaeus, 1758) | 218 |
| 50. | Merluccius merluccius (Linnaeus, 1758) | 220 |
| 51. | Halobatrachus didactylus (Bloch & Schneider, 1801) | 222 |
| 52. | Stromateus fiatola Linnaeus, 1758 | 224 |
| 53. | Pomatomus saltatrix (Linnaeus, 1766) | 226 |
| 54. | Auxis thazard (Lacépède, 1800) | 228 |
| 55. | Sarda sarda (Linnaeus, 1758) | 230 |
| 56. | Scomber scombrus Linnaeus, 1758 | 232 |
| 57. | Thunnus thynnus Linnaeus, 1758 | 234 |
| 58. | Brama brama (Bonnaterre, 1788) | 236 |
| 59. | Taractichthys longipinnis (Lowe, 1843) | 238 |
| 60. | Dactylopterus volitans Linnaeus, 1758) | 240 |
| 61. | Mullus barbatus Linnaeus, 1758 | 242 |
| 62. | Mullus surmuletus Linnaeus, 1758 | 244 |
| 63. | Callionymus lyra Linnaeus, 1758 | 246 |
| 64. | Macroramphosus scolopax (Linnaeus, 1758) | 248 |
| 65. | Hippocampus guttulatus Cuvier 1829 | 250 |
| 66. | Syngnathus acus Linnaeus, 1758 | $^{2}5^{2}$ |
| 67. | Gobius niger Linnaeus, 1758 | 254 |
| 68. | Gobius paganellus Linnaeus, 1758 | 256 |
| 69. | Sphyraena sphyraena (Linnaeus, 1758) | 258 |
| 70. | Citharus linguatula (Linnaeus, 1758) | 260 |
| 71. | Scophthalmus rhombus (Linnaeus, 1758) | 262 |
| 72. | Arnoglossus laterna (Walbaum, 1792) | 264 |
| 73. | Platichthys flesus (Linnaeus, 1758) | 266 |
| 74. | Dagetichthys lusitanicus (de Brito Capello, 1868) | 268 |
| 75. | Microchirus azevia (de Brito Capello, 1867) | 270 |
| 76. | Dicologlossa cuneata (Moreau, 1881) | 272 |
| 77• | Pegusa lascaris (Risso, 1810) | 274 |
| 78. | Solea solea (Linnaeus, 1758) | 276 |
| 79. | Xiphias gladius Linnaeus, 1758 | 278 |
| 8o. | Lichia amia (Linnaeus, 1758) | 280 |
| 81. | Trachurus mediterraneus (Steindachner, 1868) | 282 |
| 82. | Trachurus trachurus (Linnaeus, 1758) | 284 |
| 83. | Remora remora (Linnaeus, 1758) | 286 |
| 84. | Coryphaena hippurus Linnaeus, 1758 | 288 |
| 85. | Atherina boyeri Risso, 1810 | 290 |
| 86. | Belone belone (Linnaeus, 1760) | 292 |
| 87. | Hyporhamphus picarti (Valenciennes, 1847) | 294 |
| 88. | Exocoetus volitans Linnaeus, 1758 | 296 |
| 89. | Chelon labrosus (Risso, 1827) | 298 |
| | | |

10 LA ICTIOLOGÍA DE ANDALUCÍA

| 90. | Mugil cephalus Linnaeus, 1758 | 300 |
|------|--|----------|
| 91. | Blennius ocellaris Linnaeus, 1758 | 302 |
| 92. | Coryphoblennius galerita (Linnaeus, 1758) | 304 |
| 93. | Lipophrys pholis (Linnaeus, 1758) | 306 |
| 94. | Parablennius gattorugine (Linnaeus, 1758) | 308 |
| 95. | Capros aper (Linnaeus, 1758) | 310 |
| 96. | Luvarus imperialis Rafinesque, 1810 | 312 |
| 97. | Lophius piscatorius Linnaeus, 1758 | 314 |
| 98. | Mola mola (Linnaeus, 1758) | 316 |
| 99. | Diodon hystrix Linnaeus, 1758 | 318 |
| 100. | Balistes capriscus Gmelin, 1789 | 320 |
| IOI. | Polyprion americanus (Bloch & Schneider, 1801) | 322 |
| 102. | Dicentrarchus labrax (Linnaeus, 1758) | 324 |
| 103. | Dicentrarchus punctatus (Bloch, 1792) | 326 |
| 104. | Epinephelus costae (Steindachner, 1878) | 328 |
| 105. | Epinephelus marginatus (Lowe, 1834) | 330 |
| 106. | Mycteroperca rubra (Bloch, 1793) | 33^{2} |
| 107. | Serranus cabrilla (Linnaeus, 1758) | 334 |
| 108. | Serranus scriba (Linnaeus, 1758) | 336 |
| 109. | Parapristipoma octolineatum (Valenciennes, 1833) | 338 |
| IIO. | Plectorhinchus mediterraneus (Guichenot, 1850) | 340 |
| III. | Pomadasys incisus (Bowdich, 1825) | 34^{2} |
| 112. | Boops boops (Linnaeus, 1758) | 344 |
| 113. | Dentex canariensis Steindachner, 1881 | 346 |
| 114. | Dentex dentex (Linnaeus, 1758) | 348 |
| 115. | Dentex gibbosus (Rafinesque, 1810) | 350 |
| 116. | Dentex macrophthalmus (Bloch, 1791) | 35^{2} |
| 117. | Diplodus annularis (Linnaeus, 1758) | 354 |
| 118. | Diplodus bellottii (Steindachner, 1882) | 356 |
| 119. | Diplodus cervinus (Lowe, 1838) | 358 |
| 120. | Diplodus puntazzo (Walbaum, 1792) | 360 |
| 121. | Diplodus sargus (Linnaeus, 1758) | 362 |
| 122. | Diplodus vulgaris (Geoffroy Saint-Hilaire, 1817) | 364 |
| 123. | Lithognathus mormyrus (Linnaeus, 1758) | 366 |
| 124. | Oblada melanurus (Linnaeus, 1758) | 368 |
| 125. | Pagellus acarne (Risso, 1827) | 370 |
| 126. | Pagellus bellottii Steindachner, 1882 | 372 |
| 127. | Pagellus bogaraveo (Brünnich, 1768) | 374 |
| 128. | Pagellus erythrinus (Linnaeus, 1758) | 376 |
| 129. | Pagrus auriga Valenciennes, 1843 | 378 |
| 130. | Pagrus pagrus (Linnaeus, 1758) | 380 |
| 131. | Sarpa salpa (Linnaeus, 1758) | 382 |
| _ | Sparus aurata Linnaeus, 1758 | 384 |
| 133. | Spicara smaris (Linnaeus, 1758) | 386 |
| 134. | Spondyliosoma cantharus (Linnaeus, 1758) | 388 |

Índice de contenidos 11

| | 135. | Argyrosomus regius (Asso, 1810) | 390 |
|-----|------|---|-----|
| | | Sciaena umbra Linnaeus, 1758 | 392 |
| | 137. | | 394 |
| | 138. | Umbrina ronchus Valenciennes, 1843 | 396 |
| | 139. | Cepola macrophthalma (Linnaeus, 1758) | 398 |
| | 140. | Chromis chromis (Linnaeus, 1758) | 400 |
| | 141. | Coris julis (Linnaeus, 1758) | 402 |
| | 142. | Labrus bergylta Ascanius, 1767 | 404 |
| | 143. | Labrus viridis Linnaeus, 1758 | 406 |
| | 144. | Symphodus mediterraneus (Linnaeus, 1758) | 408 |
| | 145. | Symphodus rostratus (Bloch, 1791) | 410 |
| | 146. | Thalassoma pavo (Linnaeus, 1758) | 412 |
| | 147. | Trachinus draco Linnaeus, 1758 | 414 |
| | 148. | Uranoscopus scaber Linnaeus, 1758 | 416 |
| | 149. | Scorpaena porcus Linnaeus, 1758 | 418 |
| | 150. | Scorpaena scrofa Linnaeus, 1758 | 420 |
| | 151. | Chelidonichthys cuculus (Linnaeus, 1758) | 422 |
| | 152. | Chelidonichthys lastoviza (Bonnaterre, 1788) | 424 |
| | 153. | Chelidonichthys lucerna (Linnaeus, 1758) | 426 |
| | 154. | Chelidonichthys obscurus (Walbaum, 1792) | 428 |
| | 155. | Eutrigla gurnardus (Linnaeus, 1758) | 430 |
| | 156. | Lepidotrigla cavillone (Lacépède, 1801) | 432 |
| | 157. | <i>Trigla lyra</i> Linnaeus, 1758 | 434 |
| | 158. | Peristedion cataphractum (Linnaeus, 1758) | 436 |
| | 159. | Balaena mysticetus Linnaeus, 1758 | 438 |
| | 160. | Phocoena phocoena (Linnaeus, 1758) | 440 |
| | 161. | Orcinus orca (Linnaeus, 1758) | 442 |
| | 162. | Loligo vulgaris Lamarck, 1798 | 444 |
| | 0 | Octopus vulgaris Cuvier, 1797 | 446 |
| | | Sepia officinalis Linnaeus, 1758 | 448 |
| | 165. | Sepiola rondeletii Leach, 1817 | 450 |
| 2.3 | Esp | ecies que Cabrera únicamente determinó | 453 |
| | 166. | Cetorhinus maximus (Gunnerus, 1765) | 454 |
| | 167. | Centrophorus granulosus (Bloch & Schneider, 1801) | 456 |
| | 168. | Leucoraja fullonica (Linnaeus, 1758) | 458 |
| | 169. | Mobula mobular (Bonnaterre, 1788) | 460 |
| | 170. | Chimaera monstrosa Linnaeus, 1758 | 462 |
| | 171. | Ophisurus serpens (Linnaeus, 1758) | 464 |
| | 172. | Micromesistius poutassou (Risso, 1827) | 466 |
| | 173. | 1 | 468 |
| | 174. | • 7 | 470 |
| | 175. | • • | 472 |
| | 176. | Thunnus albacares (Bonnaterre, 1788) | 474 |
| | 177. | Nesiarchus nasutus Johnson, 1862 | 476 |

12 LA ICTIOLOGÍA DE ANDALUCÍA

| | 178. Ruvettus pretiosus Cocco, 1833 | 478 |
|-----|---|---------|
| | 179. Lepidopus caudatus (Euphrasen, 1788) | 480 |
| | 180. Nerophis ophidion (Linnaeus, 1758) | 482 |
| | 181. Syngnathus typhle Linnaeus, 1758 | 482 |
| | 182. Scophthalmus maximus (Linnaeus, 1758) | 486 |
| | 183. Caranx rhonchus Geoffroy Saint-Hilaire, 1817 | 488 |
| | 184. Naucrates ductor (Linnaeus, 1758) | 490 |
| | 185. Seriola dumerili (Risso, 1810) | 492 |
| | 186. Trachinotus ovatus (Linnaeus, 1758) | 494 |
| | 187. Scomberesox saurus (Walbaum, 1792) | 496 |
| | 188. Chelon auratus (Risso, 1810) | 498 |
| | 189. Chelon ramada (Risso, 1827) | 500 |
| | 190. Lepadogaster lepadogaster (Bonnaterre, 1788) | 502 |
| | 191. Anthias anthias (Linnaeus, 1758) | 502 |
| | 192. Spicara maena (Linnaeus, 1758) | 506 |
| | 193. Labrus merula Linnaeus, 1758 | 508 |
| | 194. Labrus mixtus Linnaeus, 1758 | 510 |
| | 195. Symphodus tinca (Linnaeus, 1758) | 512 |
| | 196. Ammodytes tobianus Linnaeus, 1758 | 512 |
| | 197. Helicolenus dactylopterus (Delaroche, 1809) | 516 |
| 2.4 | Especies que Cabrera mencionó, pero no llegó a observar | 519 |
| | 198. Huso huso (Linnaeus, 1758) | 520 |
| | 199. Pleuronectes platessa Linnaeus, 1758 | 522 |
| | 200. Coryphaena equiselis Linnaeus, 1758 | 5^{2} |
| | 201. Chelon saliens (Risso, 1810) | 526 |
| | 202. Illex coindetii (Vérany, 1839) | 528 |
| 2.5 | Especies que Cabrera no mencionó, | |
| | pero estaban en la Colección del Instituto de Cádiz | 53 |
| | 203. Oxynotus centrina (Linnaeus, 1758) | 532 |
| | 204. Cobitis paludica (De Buen, 1930) | 534 |
| | 205. Chauliodus sloani Bloch & Schneider, 1801 | 536 |
| | 206. Echeneis naucrates Linnaeus, 1758 | 538 |
| | 207. Ranzania laevis (Pennant, 1776) | 540 |
| 2.6 | Especies desconocidas | 543 |
| | 208. El Duarto o Quarto, Choetodon Minimus | 544 |
| | 209. Sparus Pinnilepidus | 544 |
| | 210. El Salpa Jurel, Gasterosteus Trachurus | 545 |
| | 211. El Trasalte, Choetodon Truncatum | 545 |
| | 212. El Higo, Sparus virescens | 546 |
| | 213. Rapulto, Squalus | 546 |
| | 214. La Cañabota, <i>Raya</i> | 547 |
| | 215. Sin nombre, Choetodon Sparoides | 547 |
| | 216. Sin nombre, Blennius simus | 548 |

Índice de contenidos 13

| 217. | El Bordayo | 548 |
|-----------------|---|-----------------|
| 218. | . El Cayote | 549 |
| 219. | . El Champán | 549 |
| 220 | . El Escarapelo | 550 |
| 221. | La Gasula | 55° |
| 222. | . La Lopena | 551 |
| _ | . El Pasador | 55 ¹ |
| | . La Penca | 55^{2} |
| _ | . El Peralta | 55^{2} |
| | . El Robine | 553 |
| 227. | . El Rapel | 553 |
| | BIBLIOGRAFÍA | |
| Fuentes docu | mentales | 557 |
| Biografías | | 558 |
| Botánica | | 559 |
| Diccionarios | | 560 |
| Ictionimia | | 561 |
| Ictiología, tax | onomía | 565 |
| Pesquerías | | 576 |
| General | | 577 |
| | ANEXOS | |
| Anexo I | Bibliografía histórica sobre ictiología española | 581 |
| Anexo II | Tabla de ictiónimos y especies por grupos | 582 |
| Anexo III | Lista manuscrita | 583 |
| Anexo IV | Memoria descriptiva | 588 |
| Anexo V | Addenda | 592 |
| Anexo VI | Lista impresa | 593 |
| Anexo VII | Lista adaptada al sistema de Bloch | 599 |
| Anexo VIII | Comparación Cabrera-Bloch | 600 |
| Anexo IX | Colección del Instituto de Cádiz | 601 |
| Anexo X | Explicación de la terminología ictiológica de Cabrera | 603 |
| | ÍNDICES | |
| Índice de non | mbres científicos | 617 |
| Índice de nor | 629 | |

14 LA ICTIOLOGÍA DE ANDALUCÍA